

## **DIRECTIVE CONCERNANT LES DÉTENUS SUSPECTÉS D'ÊTRE INFECTÉS OU EFFECTIVEMENT INFECTÉS PAR LE CORONAVIRUS**

**DÉTENU** : isoler<sup>1</sup> (limiter la présence en dehors de la cellule au strict nécessaire)

**Avant** de quitter la cellule :

- mettre un masque chirurgical bucco-nasal<sup>2</sup>
- se laver les mains à l'eau et au savon

**PERSONNEL** :

Rester à une distance d'un mètre cinquante du patient détenu placé à l'isolement

S'il n'est pas possible de se tenir à une distance d'un mètre cinquante ou avant de pénétrer dans la cellule : Mettre un masque<sup>3</sup> bucco-nasal FFP2 et porter des gants<sup>4 5</sup>

En cas de contact direct pour examen ou traitement du patient :

- porter un masque chirurgical bucco-nasal
- porter des gants
- porter des lunettes de protection

**CELLULE** :

Chaque jour et à la fin de l'isolement, nettoyer toutes les surfaces (table, poignée de porte, lunette des toilettes, sol...) avec de l'eau contenant 1% d'eau de Javel (10 ml d'eau de Javel pour 1 litre d'eau) et aérer plusieurs fois par jour pendant 30 minutes (porte de la cellule fermée durant l'aération !).

**TRANSPORT** : par ambulance (le détenu porte un masque bucco-nasal). Les accompagnateurs dans l'ambulance portent un masque bucco-nasal FFP2 et des gants

**LA PENURIE MONDIALE DE MOYENS DE PROTECTION (MASQUES, GEL DESINFECTANT POUR LES MAINS...) TOUCHE EGALEMENT LES PRISONS. N'UTILISEZ DONC LES MOYENS DISPONIBLES EN QUANTITE LIMITEE QUE SI C'EST NECESSAIRE.**

---

<sup>1</sup> le médecin consigne la mesure d'isolement dans le dossier médical

<sup>2</sup> fournir chaque jour un nouveau masque

<sup>3</sup> utiliser le même masque pendant tout le shift

<sup>4</sup> se laver les mains (ou les désinfecter) après avoir retiré les gants

<sup>5</sup> aérer la cellule libérée avant de nettoyer. Le détenu servant porte un masque FFP2 et des gants.